



キク編



病害虫注意報

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

2011年11月作成



ハダニ類・アザミウマ類・ハモグリバエ類・アブラムシ類・白さび病の発生に注意しましょう！

今年は例年に比べ、ハダニ類の発生は少ないようですが、油断をして防除を怠っていたら、大発生！というお話も聞きます。また暖かい日が続いているため、アザミウマ類、アザミウマ類が媒介するえそ病の発生やその他、微小害虫も活動しやすくなっています。

※地域の防除事例を基に作成しています(輪菊栽培)。品種、栽培条件によっては薬害が発生する場合がありますので、ご注意ください。さらに、展着剤、葉面散布剤などを加用する場合も、ご注意ください。

今月のおすすめローテーション

白さび病	ジマンダイセンフロアブル	500~800倍	—/8回
ハダニ類	ダニトロンフロアブル	1,000~2,000倍	発生初期/1回
ミカンキイロアザミウマ	アフーム乳剤	1000~2000倍	発生初期/5回

白さび病	チルト乳剤25	3000倍	発病初期/3回
ハダニ類	ダニサラバフロアブル	1,000倍	発生初期/2回
アブラムシ類 アザミウマ類 ハモグリバエ類 カメムシ類	ダントツ水溶剤	2000~4000倍 (アザミウマ類は2000倍)	発生初期/4回

白さび病 うどんこ病 アブラムシ類	ピリカット乳剤	1000倍	発病初期/6回 (うどんこ病は2000倍)
ハダニ類	スターマイトフロアブル	2000倍	発生初期/1回
アブラムシ類 ミカンキイロ アザミウマ ハダニ類	アーデント水和剤	1000倍	発生初期/5回

白さび病 うどんこ病	アンビルフロアブル	1000倍	発病初期/7回
ナミハダニ	マイトコーネフロアブル	1000倍	開花前/1回
ミカンキイロ アザミウマ マメハモグリバエ	カスケード乳剤	2000倍	—/3回

おすすめ資材

ファイトマジック 1000倍



◆吸収力の高いキレートマグネシウムとバランスよく配合された微量元素が入っています。
◆ハダニの加害で葉が黄化する、低温、多湿になると蒸れて、葉が黄化してしまう方に！

肥料登録：生第87201

暖房機の準備の時に
吹出口に設置しましょう！

置らくじゃん



芳香液
(成分：桂皮油・ユーカリ油)

★人体、環境に安全な天然成分です。

★2~4個/10a