



ミニトマト編



病害虫注意報

2012年1月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。



疫病特集

発病が認められる圃場があります。一旦発病すると広がるのが早いので注意しましょう！



症状: 葉、茎、果実に発生する。初め灰緑色水浸状で、次第に暗褐色大型病斑になる。多湿時には、表面に白色のかびを生ずる。

発病条件: やや低温(20℃くらい)で、湿度が高い時(曇雨天時など)。

注意点:

- ・感染～発病が短く、発病条件がそろると**短期間で大発生する。**
- ・発生初期は**灰色かび病と間違えやすい**(薬剤が全く違うので、病気の判断と剤の選択は慎重に)。

おすすめ防除薬剤

ライメイロアブル 2000～4000倍(前日/4回) 予

ホライズンDF 1500～2500倍(前日/3回) 予・治

レーバスフロアブル 2000倍(前日/3回) 予

フォリオゴールド 800～1000倍(7日/2回) 予・治

おすすめローテーション

※今月は疫病、灰色かび病、葉かび病、すすかび病に注意しましょう！！

※コナジラミの発生が見られる圃場があります。少発生のうちに確実に防除しましょう！！

葉かび病
灰色かび病
菌核病
うどんこ病
コナジラミ類
アブラムシ類

アフエットフロアブル 2000倍 (収穫前日まで/3回) 予

※葉かび病、灰色かび病、菌核病は2000倍

バリアード顆粒水和剤 4000倍 (収穫前日まで/3回)ハチ:1日

汚れ注意!

葉かび病
灰色かび病
菌核病

ベンレート水和剤 2000～3000倍

(収穫前日まで/3回) ※菌核病は2000倍

ディアナSC 2500～5000倍 予・治

(収穫前日まで/2回)ハチ:1日

※コナジラミ類、アザミウマ類は2500倍

疫病
輪紋病
葉かび病

ペンコゼブフロアブル 1000倍 予

(収穫前日まで/2回)

ウララDF 2000～4000倍

(収穫前日まで/3回)ハチ:1日

※コナジラミ類、ミカンキイロアザミウマは2000倍

コナジラミ類
アブラムシ類

葉かび病
すすかび病
コナジラミ類
トマトサビダニ

トリフミン水和剤 3000～5000倍(収穫前日まで/5回) ※すすかび病は3000倍

クリアザールフロアブル 2000～4000倍(収穫前日まで/2回)ハチ:1日

※トマトサビダニは2000倍

予・治

おすすめ展着剤☆

とにかく広がる！
汚れが少ない！

フレイクスルー

使用倍率: 5,000～10,000倍

薬液を調整した後の一番最後に入れましょう。

拡張性が高い！ 汚れの軽減効果が高い！！
散布後の乾きが早い！！！！



◆◆ 新年のご挨拶 ◆◆

あけまして おめでとうございます

本年も皆様の作物の健康をお守りするため、病害虫や農業に関する情報をお届けしますので、今後ともよろしく願い致します。

