



キュウリ編



病害虫注意報

2012年2月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。



春先の防除 ローテーション

徐々に害虫が動き出します。引き続き、病害の発生もありますので、防除を行ってください。

環境・品種・展着剤・液肥などの混用によって薬害が発生する恐れがありますのでご注意ください。



べと病・褐斑病
炭疽病・灰色かび病・菌核病
うどんこ病・黒星病

アミスターオプティフロアブル 1,000倍(前日/4回)
コルト顆粒水和剤 4,000倍(前日/3回)

アブラムシ類・コナジラミ類

べと病・褐斑病
炭疽病・灰色かび病
うどんこ病

テーク水和剤 600~800倍(前日/3回)
アフーム乳剤 2,000倍(前日/2回)

トマトハモグリハエ
ミナキイロアザミウマ
ウリノメイガ、ハスモンヨトウ

べと病

ベトファイター顆粒水和剤 2,000~3,000倍(前日/3回)
コテツフロアブル 2,000倍(前日/3回)

ミナキイロアザミウマ
ミカンキイロアザミウマ
ハダニ類・ウリノメイガ

つる枯病
灰色かび病・菌核病

スマレックス水和剤 1,000~2,000倍(前日/6回)
つる枯病は1,000倍

コナジラミ類
ミナキイロアザミウマ
アブラムシ類

ダントツ水溶剤 2,000~4,000倍(前日/3回)

アザミウマ類の発生が増えていきます。

粘着板(青色)の設置・観察、新芽の観察、
ハウス周りの除草、

防虫ネットの設置・補修などを行ってください！

黄化えそ病の発生が見られたら、早めに抜き取ってください。



粘着板をビニールテープに横向きに
ホッチキスで留めて設置すると、
ヒラヒラしくなります。生長点近く
にずらすのも楽になります！

非選択性茎葉除草剤
ザクザ液剤！
素早く枯らします！



おすすめ資材

置らくじゅん

芳香性環境保護液
(成分:桂皮油、ユーカリ油)

そろそろ交換の
時期です！残量を
確認しましょう♪



※取り替え時期の目安は、主成分である
ニッキの芳香が無くなった時です。



冬場のマグネシウム欠乏に！

ファイトマジック 1,000倍

マグネシウム7.0%、マンガン0.2%
ホウ素0.1%、他各種微量元素

アルカリ性農薬、石灰硫黄合剤、アゾキシストロビン剤(アミスター)、
クレソキシムメチル剤(ストロビー)、ルジオキシニル剤(セイビアー、
ジャストミート)、ボスカリド剤(カンタスDF)、無機銅剤、ホルモン剤、
液肥類との混用はさけてください



肥料登録:
生第87201号