



イチゴ編



病害虫注意報
2017年3月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

収穫作業等で忙しい時期ではありますが 定期的な防除を心掛けていきましょう！

収穫中 おすすめローテーション④

時期	対象 病害虫	薬剤名	倍率	使用 時期	回数	影響日数			
						ミツ バチ	マルハ バチ	ミカ	刊
3月 ①	灰色かび病 うどんこ病 輪斑病	アフエットフロアブル 予	2,000倍	前日	3回	0日	1日	0日	
	ハダニ類	マイトコーネフロアブル 卵 成虫 幼虫 速 残効	1,000倍	前日	2回		1日		0日
3月 ②	うどんこ病 灰色かび病	フルピカフロアブル 予	2,000~ 3,000倍	前日	3回		1日		0日
	アブラムシ類 アザミマダラ類・コガネムシ類 ハスモンヨトウ	ベネビアOD ※展着剤加用不可 残効	2,000~ 4,000倍	前日	3回		1日		0日
3月 ③	灰色かび病 菌核病、黒斑病	ロブルール水和剤 予・治	1,500倍	前日	4回		1日		0日
	灰色かび病	ロブルール500アクア	1,000~ 1,500倍				1日		0日
	ハダニ類	ダニサラバフロアブル 卵 成虫 幼虫 遅 残効	1,000倍	前日	2回		1日		0日

★ いずれの薬剤も、高温時・多湿時の散布は控えその日のうちにきちんと乾かしましょう！

おすすめ資材

遮光剤

Q4ホホワイト




★ハウス内を涼しくし、人にも作物にも快適な環境にします。

★優れた耐候性。

★散布後の器具の洗浄は、乾く前にしっかり行なってください。

★15L・20kg/缶



Q4ホホワイト
粒子イメージ



他社品
粒子イメージ

使用量	遮光率
1.3缶	約45%
1缶	約40%
0.8缶	約30%
0.5缶	約20%

※ 150L/10a の散布量として



他にも用途・目的に合わせた遮光剤を取り扱っております。詳しくは各担当営業にお問い合わせください。

