



ナス編



病害虫注意報
2017年3月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

春の防除 ローテーション

気温が上がり徐々に害虫の動きが活発になります。また、暖房機が止まり多湿環境になりやすいため、病気の発生が助長されます。圃場環境や樹の状態を再確認しましょう。環境・品種・展着剤・液肥などの混用によって薬害が発生する恐れがありますのでご注意ください。

	対象病害虫	薬剤名	倍率	使用時期	回数	影響日数	
						マルハナ	ミツバチ
①	ミナキイロアザミ類・ハダニ類・マハダニ類	カスケード乳剤 ※注1	2,000~4,000倍	前日	4回	2日	1日
	うどんこ病	ガッテン乳剤	5,000倍	前日	2回	0日	0日
②	アザミ類・アブラムシ類 コナジラミ類・テントウムシ類	モスピラン顆粒水溶剤	2,000~4,000倍	前日	3回	1日	1日
	灰色かび病・すすかび病 菌核病・うどんこ病	アフエットフロアブル	2,000倍	前日	3回	1日	0日
③	アザミ類・ハダニ類 マハダニ類・オオハダニ類 ハスモンヨトウ・チャノコ類	アフアーム乳剤	2,000倍	前日	2回	2日	2日
	菌核病・灰色かび病	ピクシオDF	2,000倍	前日	4回	1日	1日
④	ミナキイロアザミ類 コナジラミ類・アブラムシ類	ウララDF	2,000~4,000倍	前日	3回	0日	0日
	すすかび病・うどんこ病	トリフミン水和剤	3,000~5,000倍	前日	5回	1日	0日

※注1 カスケード乳剤使用上の注意 ・「千両2号」「みず茄子」では果実に薬害が生じる恐れのため使用不可 ・浸透性を高める効果がある展着剤の加用不可

症状	原因	対策①	対策②
成り疲れ	根傷み、同化養分の不足	ファイトメットを灌注施用 150g/反又は2000倍	ファイトオーツーツー +ファイカル 2~5日後混合散布 各1000倍
徒長ぎみ①	高夜温、低温多湿、日照不足	ファイトオーツーツー+エレマックス赤0-28-26を混用散布	各1000倍
徒長ぎみ②	窒素過多からくる徒長	エレマックス赤0-28-26 500倍液散布	

こんな時こそ
ファイトシリーズ
の出番

春おすすめ資材

循環扇



暖房機が動かない施設内は空気が滞りやすく、作物の周りは湿度が高い状態になります。湿性菌等の発生を予防するために、循環扇により空気を動かして湿度の上昇を抑えて下さい。



アフエットとフルピカの
混合でWアタック！

農林水産省登録：第23785号
有効成分
ベンチオピラド・・・8.0%
メバニピリム・・・10.0%

ナス うどんこ病 1000倍/前日/3回

- ＜特長＞
- ①うどんこ病・灰色かび病に予防散布で安定した防除効果を発揮
 - ②既存の薬剤耐性うどんこ病・灰色かび病にも有効
 - ③収穫前日まで使用できます。
 - ④果実への汚れが少ない薬剤です。

使用回数に注意して下さい